



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 88747, 88762

ที่ รพ.400/2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

เรื่อง ขอส่งแนวทางการให้ยาผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ (Pre-Medication)

เรียน หัวหน้าภาควิชา / ประธานหน่วย / หัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการทบทวนอุบัติการณ์ Medication error ที่เกี่ยวกับการให้ยา Pre-Medication ก่อนทำหัตถการ โดยผ่านกรรมาการทบทวนทั้งในส่วนของ ระบบยา / ความเสี่ยง / กระบวนการดูแลผู้ป่วย และกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (QMR) มีมติให้จัดทำแนวทางการให้ยาผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ (Pre-Medication) และนำเสนอเข้ากรรมการคณะในเดือนกรกฎาคม 2563 บัดนี้แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่7/63 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการนำแนวทางการให้ยาผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ (Pre-Medication) ใช้ปฏิบัติสำหรับหน่วยงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน จักขอบพระคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง)
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์

แนวทางการให้ยาผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ (pre-medication)

วัตถุประสงค์ เพื่อลด medication error จากการให้ยา pre-medication

1. แพทย์/ทันตแพทย์ซักประวัติโรคประจำตัว การแพ้ยา และยาเดิมของผู้ป่วยก่อนสั่งยาเสมอ
2. การสั่งจ่ายยาต้องทำโดยแพทย์/ทันตแพทย์เท่านั้น
3. การศิษย์ข้อมูลลงระบบสารสนเทศโรงพยาบาล แพทย์/ทันตแพทย์ต้องเข้าระบบด้วยรหัสของตนเอง และต้องออกจากระบบทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน และควรเปลี่ยนรหัสผ่านของตนทุก 3 เดือน
4. กรณีที่ผู้ป่วยลืมนำยาที่ต้องรับประทานมาในวันที่นัดมาทำหัตถการ ให้แพทย์/ทันตแพทย์ เป็นผู้สั่งยาใหม่เท่านั้น
5. กรณีที่ต้องให้ผู้ป่วยรับประทานยา pre-medication ให้แพทย์/ทันตแพทย์ผู้รักษา ตรวจสอบความถูกต้องของชนิดยา และขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับประทานจริง ก่อนเริ่มลงมือทำหัตถการทุกครั้ง พร้อมลงบันทึกในเวชระเบียน
6. กรณีมีการส่งการรักษาพิเศษเพิ่มเติม ก่อนทำการรักษาในครั้งต่อไป (เช่น รับประทานยาปฏิชีวนะก่อนทำหัตถการ หรืองดยาลดกรดก่อนมารับการรักษา) ให้บันทึกลงเวชระเบียน และในใบนัดหมาย เพื่อช่วยเตือนผู้ป่วย และสื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ในวันที่นัดมารับการรักษา
7. ในกรณีที่แพทย์/ทันตแพทย์ประสงค์จะสั่งยาไว้ล่วงหน้า สำหรับให้ผู้ป่วยก่อนทำหัตถการครั้งถัดไป กรุณาให้ผู้ป่วยติดต่อห้องจ่ายยาภายในวันที่สั่งยา
8. กรณีที่แพทย์/ทันตแพทย์ต้องการสั่งยาทั้ง pre-medication และ home medication พร้อมกัน สามารถออกใบสั่งยารวมเป็นใบเดียวได้ โดยต้องระบุวิธีรับประทานยา และจำนวนยาในใบสั่งยา ให้ชัดเจนว่าให้ผู้ป่วยรับประทานยา pre-medication อย่างไร จำนวนกี่เม็ด และรับประทานยา home medication อย่างไร จำนวนกี่เม็ด
9. ยกเลิกการสำรองยา oral antibiotics และยาแก้ปวดในคลินิก