

แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิด NaOCl Accident (ผ่านทะเลาะฟัน)

สัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิด NaOCl

1. มีอาการปวดรุนแรงเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน และอาจมีอาการบวมร่วมด้วย
2. สัมพันธ์กับขณะล้างคลองรากฟันด้วย NaOCl
3. อาจมีอาการสลัดก แสบจมูก
4. มักเกิดในพื้นที่ปลายรากเปิดกว้าง/ มีขนาดใหญ่ ขยายเกินความยาว หรือฟันอยู่ชิด Maxillary sinus

การรักษา

1. หยุดให้การรักษาคคลองรากฟัน
2. ฉีดยาชาเพิ่มเพื่อระงับความเจ็บปวด
3. ล้างคลองรากฟันด้วยน้ำเกลือ ปริมาณมากๆ
4. ปิดวัสดุอุดชั่วคราว
5. จ่ายการแก้ปวด Paracetamol และยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
6. โทรติดตามอาการผู้ป่วยเป็นระยะๆ
7. นัดผู้ป่วยมาประเมินอาการทุกวันจนอาการปวดบวมหายไป

คำแนะนำแก่ผู้ป่วย

1. ภายหลังจากยาชาหมดฤทธิ์ อาจมีอาการปวดได้
2. ทานยาแก้ปวดทันทีและทานต่อเนื่องทุก 4-6 ชม.
3. ทานยาปฏิชีวนะจนหมด
4. ผู้ป่วยอาจพบว่ามีอาการใบหน้าบวม หรือจุดจ้ำเลือดออกได้เป็นเรื่องปกติ
5. ผู้ป่วยอาจพบว่ามีน้ำมูกไหลทั้งทางจมูกและลงคอ อาจมีเลือดปนบ้างเป็นเรื่องปกติ

แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิด NaOCl Accident (รั่วโดนเนื้อเยื่อในช่องปาก)

สัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิด NaOCl

1. มีอาการแสบเนื้อเยื่อในช่องปาก
2. สัมพันธ์กับขณะล้างคลองรากฟันด้วย NaOCl

การรักษา

1. หยุดให้การรักษาคคลองรากฟัน
2. ใช้ Triple Syringe ฉีดล้างในช่องปากปริมาณมากๆ

คำแนะนำแก่ผู้ป่วย

1. อาจมีอาการแสบร้อนในช่องปาก สามารถหายเองได้